

# ANÁLISIS DE LA VACUNACIÓN ANTIGRI PAL ENTRE EL PERSONAL DE ENFERMERÍA

Martínez Van Duijvenbode, H, Ramos Camacho, Y, Gómez Jerónimo, E.

La gripe estacional es una infección respiratoria aguda y contagiosa causada por el virus Influenza. Se presenta en forma de epidemias anuales y se estima que cada año afecta al 20-30% de la población. La gripe representa un grave problema de Salud Pública tanto por la morbilidad y mortalidad como por los costes económicos y sociales que origina.

El profesional sanitario, incluyendo todo aquel que esté en contacto con pacientes, se encuentra dentro de los grupos de riesgo a los que se recomienda la vacunación por su propia protección, la de sus pacientes y el resto de la población.

La eficacia y efectividad de la vacuna varía anualmente, dependiendo de las variaciones antigénicas de la cepa circulante y de factores como el estado de salud, estado inmunitario, edad del vacunado. De acuerdo a revisiones sistémicas, la eficacia de las vacunas inactivadas en adultos sanos es del 70-80%. Los efectos adversos de la vacuna son poco frecuentes y suelen ser locales, las reacciones sistémicas no son habituales y son síntomas menores que ceden en unos días.

## OBJETIVOS

- Analizar la cobertura de vacunación antigripal del personal de enfermería de un hospital comarcal en la temporada 2014-2015.
- Conocer la actitud de los enfermeros ante la campaña de vacunación antigripal.

## METODOLOGÍA

- Se realizó un estudio observacional transversal mediante cuestionario.
- La muestra se completó con un total de 82 enfermeros de distintos servicios durante los meses de octubre a enero de 2014-2015.


## RESULTADOS

**MEDIA DE EDAD: 43 AÑOS**


**TOTAL DE UN 36% DE VACUNADOS EN LA CAMPAÑA 2014-2015**

**SÓLO UN 33% AFIRMA VACUNARSE ANUALMENTE**

### Por qué se vacuna



### Por qué no se vacuna



## CONCLUSIONES

Tras analizar la cuota de vacunación en la última temporada y conocer la sensibilización por parte del personal de enfermería hacia la campaña de vacunación antigripal concluimos que, a pesar de que el porcentaje de trabajadores vacunados se encuentra dentro de los límites observados en España que ronda el 25%, cabría preguntarse por qué este porcentaje no es mayor.

Creemos que se debería potenciar la campaña informativa reforzando los conocimientos acerca de los riesgos de transmisión y eliminando conceptos erróneos. Desarrollar estrategias basadas en la evidencia conseguiría aumentar la tasa de vacunación antigripal entre los profesionales de enfermería aumentando así la protección colectiva.