

Incidencia del Maltrato Infantil en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, año 2014

Juana Gambero Sánchez, Antonio Alexis Mena Gomáriz, Paloma Granada Fernández.

Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Unidad de Gestión Pediatría.



Introducción

El maltrato infantil es, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, un grave problema de salud de permanente actualidad. Podemos definir el maltrato como abuso y desatención del que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales. El maltrato puede ser ejecutado por omisión, supresión o trasgresión de los derechos individuales y colectivos e incluye el abandono completo o parcial. Con una prevalencia en Europa (OMS, 2013) de 29,1% el maltrato psicológico, un 16,3% por negligencia, un 22,9% el maltrato físico, un 13,4% el abuso sexual en niñas y un 5,7% abuso sexual en niños.

Objetivo

Estimar la incidencia, tipología, gravedad y estacionalidad del MTI (maltrato infantil) en el Hospital Reina Sofía durante el año 2014.

Metodología.

Estudio descriptivo transversal sobre la población infantil de Córdoba atendida en dicho Hospital. Durante el año 2014 los profesionales de este centro recopilaban datos registrándolos en la Hoja de Detección y Notificación del maltrato infantil de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, siguiendo las instrucciones y detalles recogidas en la Orden de 23 de Junio de 2006 (BOJA nº 130 de fecha 7 de Julio de 2006).

Resultados

Se atendieron un total de 56 pacientes durante este periodo. Por su gravedad fueron clasificados como: 47 % leves, en un 39% moderados, 12% de ellos fueron graves y un 3% no pudieron ser clasificados por falta de indicadores (Figura 1). En la clasificación por tipologías (Figura 2) observamos que en 18 niños se produjo un maltrato físico, en 17 hubo algún tipo de negligencia y en 14 un conflicto parental filial, siendo el conflicto parental y la violencia de género los menos frecuentes con una incidencia entorno a los 3 casos. Las edades más críticas fueron los 13 años (9 casos) y el primer año de vida (8 casos) (Figura 3).

Figura 1

Clasificación MTI por Niveles de Gravedad, %




Figura 3





Figura 2

Clasificación MTI por Edades



Conclusiones

El equipo multidisciplinar de este centro deberá prestar especial atención a posibles malos tratos físicos y por negligencia, considerando como grupo de riesgo a los pacientes menores de un año y preadolescentes de 13 años. La elaboración de estadísticas anuales y su posterior difusión mediante la formación continuada al personal sanitario mejorará la identificación de casos no detectados de MTI.