

MORTALIDAD POR CÁNCER DE PRÓSTATA EN ANDALUCÍA Y ESPAÑA (ANÁLISIS CMBD) AÑOS 2011-2014.

Mercedes Jaén Montilla, Clara Isabel González Lozano,
Dolores Gutierrez Moreno



MARCO CONCEPTUAL

El cáncer de la próstata es una enfermedad que se desarrolla principalmente en varones de edad avanzada. A medida que los hombres envejecen, la próstata puede agrandarse y bloquear la uretra o la vejiga. Esto puede ocasionar dificultad para orinar o interferir con la función sexual. El problema se conoce con el nombre de hiperplasia prostática benigna que a menudo precisa de la cirugía para corregirlo. Los síntomas de la hiperplasia prostática benigna o de otros problemas que afectan la glándula pueden ser similares a los síntomas del cáncer de la próstata. El cáncer de próstata es el más frecuente de todos los cánceres entre los varones.

METODOLOGÍA

Se utiliza como fuente principal de datos las defunciones por causa (CIE 10 a tres dígitos), por grupo de edad durante los años 2011-2014, obtenidos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Se han estudiado 7 grupos de edad iniciándose el estudio a partir de los 15 años por no observarse mortalidad en edades inferiores. Con los datos obtenidos hemos confeccionado una gráfica que presentamos en el pósters.


OBJETIVO:

El objetivo de este trabajo es hacer un estudio comparativo de la mortalidad del cáncer de próstata por grupo de edad en Andalucía y España durante los años 2011-2014.


RESULTADOS

Observamos en nuestro estudio una mayor incidencia de casos de mortalidad por cáncer de próstata en el tramo de edad de más de 80 años, que en España supone el 60% de las muertes, y en Andalucía el 54%. En el tramo de edad de 70 a 79, se da una mortalidad de 28%, en España y un 31% en Andalucía. De 60 a 69 años en España se da un 9,5% y en Andalucía un 12%, el 2,5% restante en España se reparte entre las edades de 15 a 59 años. En Andalucía el 3% restante se reparten entre las edades de 30 a 59 años

España



Andalucía



CONCLUSIÓN

Como podemos observar la mortalidad por cáncer de próstata se da prácticamente en todas las edades, siendo el rango de edad donde se incrementa de forma significativa el número de casos a partir de los 60 años y crece continuamente conforme aumenta la edad, a medida que aumenta el rango de edad incrementa el número de casos tanto en Andalucía como en España.

En el año 2012 se puede apreciar un aumento de muertes en España de un 3% con respecto al 2011, y en Andalucía un 2%.

Un dato importante y esperanzador es la disminución de número de muertes por cáncer de próstata tanto en Andalucía como en España, en el periodo de estudio en España ha disminuido en 88 casos, pasando de 5.875 casos en el 2011 a 5.787 casos en el 2014, es decir, ha disminuido un 2%, y en el caso de Andalucía de los 892 fallecimientos por cáncer de próstata en el año 2011, pasa a 880 fallecimientos en el año 2014, es decir ha disminuido en 12 casos, un 1,5%, a pesar de que ha disminuido es uno de los cánceres más frecuentes entre los varones.