

RIESGO DE VIH EN MUJERES QUE EJERCEN PROSTITUCIÓN EN ALMERÍA

Autores: Wladimir Morante García; Rosa M^a Zapata Boluda; Raquel Alarcón Rodríguez.
Centro de procedencia: Universidad de Almería.
Resultados preliminares de una tesis doctoral de la Universidad de Almería
Autora dibujo original: Rosa M^a Marín Zapata

INTRODUCCIÓN

La prostitución es definida como la práctica sexual a cambio de remuneración (1). El uso indebido de drogas y alcohol antes de las prácticas sexuales, hace que estas sean de mayor riesgo y menor protección, aumentando la posibilidad de infección por VIH y otras ITS (2). La prevalencia del VIH entre el colectivo de mujeres que ejercen prostitución varía significativamente dependiendo del país donde se ejerza, pero en algunos países relacionados con el turismo sexual, la prevalencia en este colectivo es 20 veces mayor si la comparamos con la población general (3).

OBJETIVO

Conocer la prevalencia de VIH en el colectivo mujeres que ejercen prostitución y que formaron parte del programa reducción del daño para personas que ejercen prostitución desarrollado por Médicos del Mundo en Almería desde el año 2013 hasta el año 2015 .

METODOLOGÍA

Estudio Epidemiológico descriptivo transversal, el instrumento utilizado para la recogida de datos fue la ficha elaborada por Médicos del Mundo. Para el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 22.0.

La población de estudio esta compuesta por 146 mujeres prostitutas que corresponde al total de personas que se realizaron el test rápido de VIH en el programa reducción del daño para personas que ejercen prostitución desarrollado por Médicos del Mundo en Almería desde el año 2013 hasta el año 2015.

RESULTADOS

La edad media es de 31,21 años, con una desviación estándar de 6.7 y con edades comprendidas entre los 18 y los 54 años, siendo el 33,6% Rumanas ,el 17,8% Marroquíes y 13% Españolas y el resto procedían de otros países. El 98,6% dio negativo en el test y el 1,4% dio positivo. El 48,6 % de las mujeres nunca se realizaron pruebas para determinar si estaban infectadas por VIH previa al test realizado por Médicos del Mundo.

CONCLUSIONES

Las mujeres que ejercen prostitución en la provincia de Almería y que forman parte del programa reducción del daño para personas que ejercen prostitución en esta provincia desarrollado por Médicos del Mundo no son un vector de transmisión significativo frente al VIH, la diferencia respecto a la prevalencia de VIH en este colectivo en Almería en comparación a otros lugares es significativamente menor gracias al programa desarrollado por la organización.

BIBLIOGRAFIA

- 1 Thappa DM, Singh N, Kaimal S. Prostitution in India and its role in the spread of HIV infection. Indian Journal of Sexually Transmitted Diseases. 2007; 28(2): p. 69-75.
- 2 Morrison CL, McGee A, Ruben SM. Alcohol and drug misuse in prostitutes. Addiction. 1995; 90(2): p. 292-293.
- 3 UNAIDS/WHO. AIDS Epidemic Update. 2009.